

Fecha:  
09/12/2015

Asunto:  
Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de  
Granada revolucionan el diagnóstico de la psicosis

Audimetría:

	Noticias	Audiencia	Valoración
1 Internet	21	1.127.900	11.297€
2 Prensa	3	128.000	3.025€
3 Medios Sociales	11	38.779	118€
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>1.294.679</b>	<b>14.440€</b>





Asociación de Universidades Públicas Andaluzas

09/12/2015

# REVISTA DE PRENSA



# Índice

---

Distinguen los síntomas de las tres psicosis <b>Diario Médico</b> 09/12/2015 , Pág: 6	4
Síntomas mentales de la psicosis <b>Canarias 7</b> 06/12/2015 , Pág: 45	5
Un acercamiento a la psicosis <b>Granada Hoy</b> 05/12/2015 , Pág: 29	6
Un estudio del CIBERSAM redefine el diagnóstico del trastorno psicótico - JANO.es - ELSEVIER <b>@ BLOGGER</b>	7
Revolución en el diagnóstico de la psicosis <b>@ ILEON.COM</b>	11
Revolución en el diagnóstico de la ¿psicosis . Una... <b>@ BLOGGER</b>	14
Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis <b>@ BLOGGER</b>	18
Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis, salud mental La esquizofrenia, el trast <b>@ DIARIO HOY</b>	21
Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis <b>@ DIARIO MONTAÑÉS</b>	22
Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis <b>@ DIARIO VASCO.COM</b>	23
Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis <b>@ EL COMERCIO DIGITAL</b>	24
Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis <b>@ EL CORREO</b>	25
Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis <b>@ IDEAL DIGITAL</b>	26
Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis <b>@ LA RIOJA</b>	27
Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis <b>@ LA VERDAD</b>	28
Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis <b>@ LAS PROVINCIAS DIGITAL</b>	29
Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis <b>@ SUR DIGITAL</b>	30
Revolución en el diagnóstico de la psicosis <b>@ BLOGGER</b>	31
Investigación e innovación: Entrevista a Jorge Cervilla <b>@ WORDPRESS.COM</b>	32
Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granada revolucionan el diagnóstico de la psicosis infocostatropical.com <b>@ BLOGGER</b>	33

Investigadores españoles 'revolucionan' el diagnóstico de las psicosis <b>@ BLOGGER</b>	36
Revolución en el diagnóstico de la psicosis / Noticias / SINC <b>@ BLOGGER</b>	39
Un acercamiento a la psicosis <b>@ GRANADA HOY</b>	43
Científicos de la UGR corroboran diferencias significativas entre los tres tipos más importantes de psicosis <b>@ GRANADAENLARED.COM</b>	46
#Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <a href="https://t.co/PTh4jk">https://t.co/PTh4jk</a> <b>@ TWITTER</b>	48
RT @GranadaTIC: Científicos de la UGR y Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <a href="https://t.co/PTh4jk">https://t.co/PTh4jk</a> <b>@ TWITTER</b>	49
RT @SaluDigital_es: RT @GranadaTIC: Científicos de la UGR y Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <a href="https://t.co/PTh4jk">https://t.co/PTh4jk</a> <b>@ TWITTER</b>	50
#Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <a href="https://t.co/3sRzYI">https://t.co/3sRzYI</a> <b>@ TWITTER</b>	51
RT @GranadaTIC: #Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <a href="https://t.co/3sRzYI">https://t.co/3sRzYI</a> <b>@ TWITTER</b>	52
RT @manbayona: Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granada y el diagnóstico de la psicosis - <a href="https://t.co/w29E">https://t.co/w29E</a> <b>@ TWITTER</b>	53
#Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <a href="https://t.co/JeFP5j">https://t.co/JeFP5j</a> <b>@ TWITTER</b>	54
Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granada y el diagnóstico de la psicosis - <a href="https://t.co/w29EQBfWue">https://t.co/w29EQBfWue</a> via @gra <b>@ TWITTER</b>	55
RT @GranadaTIC: #Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <a href="https://t.co/JeFP5j">https://t.co/JeFP5j</a> <b>@ TWITTER</b>	56
RT @manbayona: Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granada y el diagnóstico de la psicosis - <a href="https://t.co/w29E">https://t.co/w29E</a> <b>@ TWITTER</b>	57
RT @manbayona: Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granada y el diagnóstico de la psicosis - <a href="https://t.co/w29E">https://t.co/w29E</a> <b>@ TWITTER</b>	58



## Distinguen los síntomas de las tres psicosis

MADRID  
REDACCIÓN

Un estudio realizado por el Cibersam y dirigido por Jorge Cervilla Ballesteros, catedrático de la Universidad de Granada (UGR) y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, y José Eduardo Muñoz Negro, del Complejo Hospitalario de Granada, ha mejorado el diagnóstico de los tres tipos más

frecuentes de psicosis: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado en la revista *Schizophrenia Research*, han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona. El estudio, pionero en el mundo, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de

psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

Según Cervilla Ballesteros, "las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad". 



## Síntomas mentales de la psicosis

Un estudio determina por primera vez científicamente los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante. Este trabajo del grupo de investigación Cibersam, dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada Jorge Cervilla Ballesteros, ayudará a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de es-

tos pacientes, y tiene, además, importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a estos enfermos en la actualidad, ha informado la institución académica. Este estudio pionero ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.



► 5 Diciembre, 2015

# Un acercamiento a la **psicosis**



GRANADA HOY

En el estudio han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

● Científicos de la UGR determinan por primera vez los síntomas de la esquizofrenia, y los trastornos esquizoafectivo y delirante

**R. G.** GRANADA

Un estudio del grupo de investigación 'Cibersam', dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado por primera vez los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

Según informó la UGR en un comunicado, en el trabajo, publicado por la revista *Schizophrenia Research*, también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona. Este estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de

psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad y las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado.

Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria, tal y como ha explicado el profesor Cervilla Ballesteros quien ha asegurado "las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad". Este trabajo de investigación ha supuesto "un respaldo sin precedentes hasta la fecha" en el diagnóstico de las psicosis, "un paso de gigante" que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a

El estudio corrobora que los tres tipos de psicosis son distintos de un modo significativo

los pacientes en la actualidad", explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, "deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)". Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio "ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave", concluyen.



URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 8 Diciembre, 2015


[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

# herenciageneticayenfermedad

Los avances de la medicina en el campo de la genética, por ende de la herencia, están modificando el paisaje del conocimiento médico de las enfermedades. Este BLOG intenta informar acerca de los avances proveyendo orientación al enfermo y su familia así como información científica al profesional del equipo de salud de habla hispana.

**AYÚDANOS A SEGUIR INFORMÁNDOTE Y PERMÍTENOS AYUDAR A OTROS**

## TELÓMEROS



la llave de las ciencias médicas en los próximos cien años

## herencia genética y enfermedad

Cargando...

### AddThis



### Translate

### Archivo del blog

▼ 2015 (11084)

▼ diciembre (255)

- Los hematólogos buscan reducir trasplantes y trans...
- Variantes genéticas protegen a los mayores del det...
- El cáncer hereditario, a la vanguardia de la Medic...
- B País Vasco estrena el "Código infarto" para ate...
- Inicio | StopBullying.gov
- Cáncer de garganta: MedinePlus en español
- Muy pocos estadounidenses toman los medicamentos n...
- Los pesticidas agrícolas podrían afectar a la resp...
- ¿Podría haber un gen 'para dejar de fumar'? Medi...
- ¿El esperma de un papá obeso podría pasar algunos ...
- Cómo comprender la violencia sin sentido: MedineP...
- El estado de ánimo del paciente durante un procedi...
- Abuso sexual de menores - Actualización
- Guardería infantil - Actualización
- ¿Podrían los 'tragos' de bebidas energéticas aumen...
- Cáncer de seno - Actualización
- Salud de las personas mayores - Actualización
- Conocióon cerebral - Actualización

martes, 8 de diciembre de 2015

## Un estudio del CIBERSAM redefine el diagnóstico del trastorno psicótico - JANO.es - ELSEVIER

[Un estudio del CIBERSAM redefine el diagnóstico del trastorno psicótico - JANO.es - ELSEVIER](#)

PUBLICADO EN 'SCHIZOPHRENIA RESEARCH'

### Un estudio del CIBERSAM redefine el diagnóstico del trastorno psicótico

JANO.es - 07 diciembre 2015 00:47

*La investigación corrobora la existencia de tres subtipos de psicosis: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante, una distinción que hasta hoy sólo estaba respaldada teóricamente.*

Un estudio del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), dirigido por Jorge Cervilla Ballesteros, catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, muestra la notable mejora en el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por *Schizophrenia Research*, también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

Este estudio, pionero en el mundo, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

#### Un grave trastorno mental

Como explica Cervilla Ballesteros, "las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad".

Este trabajo de investigación ha supuesto "un respaldo sin precedentes hasta la fecha" en el diagnóstico de las psicosis, "un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad", explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren Muñoz Negro y Cervilla, "deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)".

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio "ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave", concluyen.

#### Webs Relacionadas

[Schizophrenia Research \(2015\); doi: 10.1016/j.schres.2015.10.039](#)

#### Noticias relacionadas

09 Oct 2015 - Actualidad

#### Los traumas infantiles multiplican por 7 el riesgo de psicosis de adulto

Asimismo, el hecho de haber sido un gran consumidor de cannabis durante la infancia o adolescencia multiplica esta probabilidad por 6, según un estudio internacional.

22 Oct 2014 - Actualidad

#### Los pacientes con episodios de psicosis atendidos en el 12 de Octubre mejoran su pronóstico

Los individuos incluidos en el plan de atención adoptado en 2009 presentan una evolución más positiva que los atendidos antes de su puesta en marcha.

04 Jun 2014 - Actualidad

#### Registrado en España el primer caso de psicosis catatónica por consumo de 'spice', un derivado del cannabis

Profesores de la CEU Cardenal Herrera y del Hospital Provincial de Castellón describen por primera vez



URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 8 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)


Chequeo médico de la mujer - Actualización  
Un estudio respalda que simplificar el tratamiento...  
**Un estudio del CIBERSAM redefine el diagnóstico de...**  
La mortalidad por malaria se reduce un 60% en el m...  
Los nacimientos durante el fin de semana tienen má...  
Una inmunoterapia mejora el tratamiento contra el ...  
New Images from NCI Visuals Online  
**Aconsejan el cribado de Chagas en inmigrantes lati...**  
Nueva conexión entre envejecimiento y cáncer - Día...  
La TAR reduce la carga viral en más de seis veces ...  
Imágenes TC e impresión 3D ayudan a separar siames...  
Injerto meniscal artroscópico: tan eficaz como inf...  
Perder el 10% de sobrepeso frena la gonartrosis - ...  
Describen la biología de la memoria en epilepsia - ...  
Menor flujo sanguíneo detectado tras la recuperaci...  
Altas dosis de IgG modulan la dermatomiositis juve...  
Una guía para abordar el TVP en el atleta de élite...  
Nuevo material para mejorar la producción de fáрма...  
La era del acero en la cirugía protésica de cadera...  
**AMPLIATORIA DOCUMENTAL DE LA ACTUALIZACIÓN MÉDICO-...**  
**AMPLIATORIA BIBLIOGRÁFICA DE LA ACTUALIZACIÓN MÉDI...**  
ACTUALIZACIÓN MÉDICO-CONTINUADA EN MALARIA  
► Malar...  
ACTUALIZACIÓN MÉDICO-CONTINUADA EN SALUD OCUPACION...  
ACTUALIZACIÓN MÉDICO-CONTINUADA EN GENÓMICA Y SU I...  
ACTUALIZACIÓN MÉDICO-CONTINUADA EN SÍNDROME DE LYN...  
ACTUALIZACIÓN MÉDICO-CONTINUADA EN HISTORIA FAMILI...  
ACTUALIZACIÓN MÉDICO-CONTINUADA EN FÁRMACO-GENÓMIC...  
ACTUALIZACIÓN MÉDICO-CONTINUADA EN VIRUS DEL ÉBOLA...  
ACTUALIZACIÓN MÉDICO-CONTINUADA EN ENVEJECIMIENTO ...  
ACTUALIZACIÓN MÉDICO-CONTINUADA EN MICROBIOMA ► Mi...  
ACTUALIZACIÓN MÉDICO-CONTINUADA EN EPIGENÉTICA ► E...  
ACTUALIZACIÓN MÉDICO-CONTINUADA EN EDICIÓN DEL GEN...  
ACTUALIZACIÓN MÉDICO-CONTINUADA EN CÁNCER DE PIEL ...  
ACTUALIZACIÓN MÉDICO-CONTINUADA EN ENFERMEDADES EP...  
**ACTUALIZACIÓN MÉDICO-CONTINUADA EN ENFERMEDADES EP...**  
El calentamiento global podría detener la producci...  
¿Qué es el zika, el virus que se está propagando p...  
Un estudio desmiente el dimorfismo sexual en la es...  
Las patologías cardíacas, principal causa de morta...  
Los oncogenes delimitan la diferenciación de las c...  
La modificación de la microbiota intestinal como r...  
El peso del hombre afecta a la herencia que transm...  
Una rara mutación en los canales de sodio, clave p...  
La lidocaína previene complicaciones postquirúrgic...  
Cáncer metastático - National Cancer Institute  
Consejos de alimentación: Antes, durante y después...  
Dosis de radiación en exámenes de rayos X y TAC  
Exposición a la radiación: MedlinePlus en español  
Emergencias causadas por la radiación:

la relación entre el consumo de esta sustancia, el brote psicótico y los problemas que genera en el aparato locomotor.

Publicado por salud equitativa en 6:17

**No hay comentarios:**

**Publicar un comentario en la entrada**



[Entrada más reciente](#)

[Página principal](#)

[Entrada antigua](#)

Suscribirse a: [Enviar comentarios \(Atom\)](#)



URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 8 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

MedinePlus...

Deshidratación: MedinePlus en español

Información de salud para grupos específicos | CDC

Medidas médicas de respuesta (tratamientos) para  
L...

Efectos a largo plazo en la salud de la exposición...

Lesiones cutáneas por radiación (CRI) | CDC

Síndrome de irradiación aguda (ARS) | CDC

Posibles efectos en la salud de la exposición a la...

El grupo más grande que lucha actualmente contra  
L...

Un defecto en las mitocondrias del corazón causa  
M...

Una nueva inmunoterapia podría mejorar el  
tratamie...

**"De momento, la erradicación total del VIH es impo...**

Revolución en el diagnóstico de la psicosis / Noti...

Mujeres y hombres... y sus cerebros /  
Reportajes / ...

Obesidad y cirugía bariátrica inducen cambios  
epig...

La hidratación, esencial para mantener una  
nutrici...

Una terapia combinada mejora el pronóstico en  
LLC ...

Uno de cada dos españoles ha sufrido en el último ...

Cómo abordar el estrés durante el tratamiento del ...

Mantener las emociones bajo control gracias a la n...

Los nuevos casos de diabetes entre los  
estadounide...

Correr largas distancias afecta a las articulaciones...

OMS | Llamamiento de la OMS a favor de una  
interve...

OMS | Principales mensajes de la OMS para la  
COP21...

OMS | ¿Qué es un niño prematuro?

OMS | Detección de la hepatitis C y atención y tra...

Trombosis venosa profunda: MedinePlus en español

Cáncer de garganta: MedinePlus en español

OMS | Naciones Unidas: la mortalidad materna se  
ha...

OMS | Informe OMS/UNICEF: se ha alcanzado la  
meta ...

OMS | La vacunación contra el sarampión ha  
permiti...

OMS | Un nuevo informe pone de relieve cuatro  
form...

OMS | Encuesta en varios países de la OMS  
muestra ...

OMS | Informe de la OMS señala que los niños  
menor...

- noviembre (985)
- octubre (1084)
- septiembre (1002)
- agosto (860)
- julio (1025)
- junio (1002)
- mayo (1014)
- abril (970)
- marzo (1061)
- febrero (907)
- enero (919)
- 2014 (11224)
- 2013 (11115)
- 2012 (9955)
- 2011 (7885)
- 2010 (6227)
- 2009 (2565)

**NUESTRA SEÑORA DE LA  
MEDALLA MILAGROSA**



URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 8 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)



Ella me ha guiado a lo largo de mi vida

## Páginas vistas en total

### Datos personales



salud equitativa

ver historia personal en: [www.cerasale.com.ar](http://www.cerasale.com.ar)  
[dado de baja por la Cancillería Argentina por temas políticos, propio de la censura que rige en nuestro medio] // [www.revistamedicos.com.ar](http://www.revistamedicos.com.ar) // [www.quorumtuc.com.ar](http://www.quorumtuc.com.ar) // [www.sectorsalud.com.ar](http://www.sectorsalud.com.ar) // [www.maimonides.edu](http://www.maimonides.edu) // [weblog.maimonides.edu/farmacia/archives/UM\\_Informe\\_Autoevaluacion\\_FyB.pdf](http://weblog.maimonides.edu/farmacia/archives/UM_Informe_Autoevaluacion_FyB.pdf) - // [weblog.maimonides.edu/farmacia/archives/0216\\_Admin\\_FarmEcon.pdf](http://weblog.maimonides.edu/farmacia/archives/0216_Admin_FarmEcon.pdf) - // [www.documentalistas.org.ar](http://www.documentalistas.org.ar) // [www.cpcesfe2.org.ar](http://www.cpcesfe2.org.ar) // [www.nogracias.eu](http://www.nogracias.eu) // [www.estensorome.com.ar](http://www.estensorome.com.ar) // [www.cuautitlan.unam.mx/descargas/licenciaturas/bqd/plandestudio\\_bqd](http://www.cuautitlan.unam.mx/descargas/licenciaturas/bqd/plandestudio_bqd) // [www.latamjpharm.org/trabajos/25/2/LAJOP\\_25\\_2\\_6\\_1\\_M4M6Z9746D.pdf](http://www.latamjpharm.org/trabajos/25/2/LAJOP_25_2_6_1_M4M6Z9746D.pdf) // [www.nogracias.eu/v\\_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=](http://www.nogracias.eu/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=) // [www.colfarse.com.ar](http://www.colfarse.com.ar) // [www.proz.com/kudoz/english\\_to\\_spanish/art\\_literary/523942-key\\_factors.html](http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/art_literary/523942-key_factors.html) - 65k - // [www.llave.connmed.com.ar/portalnoticias\\_vernoticia.php?codigonoticia=17715](http://www.llave.connmed.com.ar/portalnoticias_vernoticia.php?codigonoticia=17715) // [www.fruscullada.com.ar/homepage/espanol/activities\\_teaching.htm](http://www.fruscullada.com.ar/homepage/espanol/activities_teaching.htm) // <http://www.on24.com.ar/nota.aspx?idNot=36331>  
||

Ver todo mi perfil

### SÍMBOLO PATRIO



ARGENTINA

### SÍMBOLO ECOLÓGICO NACIONAL





publicidad

publicidad

actualidad

0 comentario 0 votos

BIOMEDICINA Y SALUD

Revolución en el diagnóstico de la psicosis

Agencia Sinc | 08/12/2015 - 18.05h.

Una investigación española, publicada en la revista Schizophrenia Research, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante. Este trabajo ayudará a personalizar la diagnosis y tratamiento de estos pacientes.

Comparte: [Facebook, Twitter, YouTube, RSS, Email] Vota Comenta



Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios, y exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. / UGR

Un estudio del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), dirigido por Jorge Cervilla Ballesteros, catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, muestra la notable mejora en el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por la revista Schizophrenia Research, también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

publicidad



LeónRadars Localiza Todos Los Radars De Tu Ciudad En tiempo real!!

Últimas noticias en ileón.com

- 18:05 | Revolución en el diagnóstico de la psicosis
17:43 | Fallece un niño de seis años en un accidente cquad en Mieres
17:36 | La Diputación aprueba las subvenciones ocho Casas de León en España a las que destinará 55.000 euros
17:10 | Nace un grupo de trabajo de Ayuntamientos e Defensa del Ferrocarril en los Pueblos de León

publicidad



Este estudio, pionero en el mundo, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora solo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

Los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora solo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

### Un grave trastorno mental

Como explica Cervilla Ballesteros, "las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad".

Este trabajo de investigación ha supuesto "un respaldo sin precedentes hasta la fecha" en el diagnóstico de las psicosis, "un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad", explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren Muñoz Negro y Cervilla, "deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)".

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio "ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave", concluyen.

publicidad

publicidad

publicidad

Comparte:

Vota Comenta

publicidad

### comentarios

0 comentarios

Página 1 de 0

#### Escriba su comentario

Empty text area for writing a comment.

Esta es la opinión de los lectores, no de ileon.com. No está permitido escribir comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes. Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Introduce los caracteres tal y como aparecen en la caja para enviar el comentario.

Refrescar

Código \*

Nombre \*

Correo electrónico \*

Enviar

### últimas | + leídas | + comentado

18:05 | Revolución en el diagnóstico de psicosis

17:43 | Fallece un niño de seis años en un accidente de quad en Mieres

17:36 | La Diputación aprueba las subvenciones ocho Casas de León en España a las que destinará 55.000 euro

17:10 | Nace un grupo de trabajo de Ayuntamientos en Defensa del Ferrocarril en los Pueblos de León

17:09 | El autocontrol en los niños de tres años es similar al de los chimpancés

16:31 | La prestigiosa bailarina Nina Ananiashvili actuará el 16 de diciembre en el Auditorio

15:02 | Flórez y Palomo se compromete en Omaña a ser la voz de los ganaderos en el Congreso y en el Senado

14:46 | UPL exige a la Junta "más celeridad" para la puesta en marcha de la biorrefinería de Barcial del Barco

14:15 | CyL Digital organiza del 14 al 18 de diciembre un taller sobre radio online podcast en León

13:44 | IU denuncia la "sanqría



demográfica\* en León por las políticas d  
PP y PSOE


publicidad

[Quiénes somos](#) [Contacto](#) [Contratar publicidad](#) [Aviso legal](#) [Mapa web](#) [Política de Cookies](#)

ileón.com

[Política](#) [Actualidad](#) [Cultura](#) [Universidad](#) [Deportes](#) [Ciencia](#) [Formación](#) [Blogs](#)

© ileon.com | Información de León  
Gran Vía de San Marcos, 38, Planta 7. León (España)  
Algunos derechos reservados.





URL:  
 PAÍS: España  
 TARIFA: 2 €

UUM: -  
 UUD: -  
 TVD: -  
 TMV: -



► 7 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)



lunes, 7 de diciembre de 2015


Stefano Mancuso, habla con las plantas.

## n en el diagnóstico de la psicosis

Una investigación española, publicada en la revista *Schizophrenia Research*, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizo trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante. Este trabajo ayudará a personalizar la diagnosis y tr



Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios, y exhibir cambios en su personalidad.





URL:  
 PAÍS: España  
 TARIFA: 2 €

UUM: -  
 UUD: -  
 TVD: -  
 TMV: -



► 7 Diciembre, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

pensamiento desorganizado. / UGR



Un estudio del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), dirigido de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de G diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esc

En el trabajo, publicado por la revista *Schizophrenia Research*, también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

Este estudio, pionero en el mundo, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora solo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

*Los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora solo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente*

La psicosis hace referencia a un estado mental contacto con la realidad. Las personas que e alucinaciones o delirios y pueden exhibir caml desorganizado. Estos síntomas pueden ser acor o extraño, así como por dificultad para interactua cabo actividades de la vida diaria.

**Un grave trastorno mental**

Como explica Cervilla Ballesteros, "las psicosis que se manifiestan con distorsiones en su percep

Este trabajo de investigación ha supuesto "un re el diagnóstico de las psicosis, "un paso de c implicaciones para las prestaciones sociales y s actualidad", explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren Muñoz Negro y Cervilla, "deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maniaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)".

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico Sa: Cecilio "ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave", concluyen.

**Referencia bibliográfica:**

José E. Muñoz-Negro, Inmaculada Ibanez-Casas, Enrique de Portugal, Susana Ochoa, Montserrat Dolz, Josep M. Haro, Miguel Ruiz-Veguilla, Juan de Dios Luna del Castillo, Jorge A. Cervilla. A dimensional comparison between delusional disorder, schizophrenia and schizoaffective disorder. *Schizophrenia Research* DOI: <http://dx.doi.org/10.1016>



coches segunda mano  
 coches segunda mano

Publicado por Alfredo Moles en 9:00

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

[Página principal](#)

[Entrada antigua](#)

[Un cáncer humillante](#)

Suscribirse a: [Enviar comentarios \(Atom\)](#)





URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 7 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

Subscripción Correo  
Presubscripción

Todo tiene precio

## Archivo del blog

- ▼ 2015 (448)
  - ▼ diciembre (7)
    - ▼ dic 07 (1)
      - Revolución en el diagnóstico de la psicosis .Una ....
    - ▶ dic 06 (1)
    - ▶ dic 04 (1)
    - ▶ dic 03 (1)
    - ▶ dic 02 (2)
    - ▶ dic 01 (1)
  - ▶ noviembre (38)
  - ▶ octubre (41)
  - ▶ septiembre (30)
  - ▶ agosto (34)
  - ▶ julio (41)
  - ▶ junio (34)
  - ▶ mayo (49)
  - ▶ abril (48)
  - ▶ marzo (45)
  - ▶ febrero (35)
  - ▶ enero (46)
- ▶ 2014 (522)
- ▶ 2013 (421)
- ▶ 2012 (431)
- ▶ 2011 (337)
- ▶ 2010 (179)
- ▶ 2009 (88)
- ▶ 2008 (54)
- ▶ 2007 (12)

## Datos personales



**B** Alfredo Mofes

1,71 de altura,68 Kgr.canoso total,bigote . Voluntario internacionalista en Angola,fundador de la columna argentina del ELN del Ché. Miembro de la ALN de Carlos Manghella

[Ver todo mi perfil](#)

**RBA**

LA CONQUISTA DE,




URL:  
 PAÍS: España  
 TARIFA: 2 €

UUM: -  
 UUD: -  
 TVD: -  
 TMV: -



► 7 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)



Una revisión cr

ANTONIO ESPINO L

Antonio Espino L  
**La conquista  
 de América**  
 Una revisión crítica



### Translate

Live Traffic Stats

avisos

Páginas  
 vistas en  
 total

### Entradas populares

#### QUIEN TIENE EL PENE MAS GRANDE

Los penes más grandes están en el Congo La web Targetmap ha diseñado el primer mapa de los penes del mundo. Se trata de un papam...

#### NO SE ANGUSTIE POR LA PSORIASIS, TIENE SOLUCION

Psoriasis: una enfermedad de la piel crónica pero tratable Escamas localizadas en el cuero cabelludo. (Son Espases/EP) ...

#### ¿SON VULVAS O ALMEJAS ?

REPORTAJE | AUMENTAN LAS CIRUGÍAS DE REJUVENECIMIENTO GENITAL EN MUJERES, UNA PRÁCTICA PROCEDENTE DE EE UU Y BRASIL ...



#### ANTIBIOTICOS

Más de la mitad de las veces los antibióticos no son necesarios Su uso incorrecto, especialmente en afecciones respiratorias, hace temer que...

#### CHICAS QUEDAN MAS LINDAS SIN CORPINO

Un estudio concluye que el sujetador es una falsa necesidad Una modelo de lencería muestra un sujetador. (EFE) Los senos s...



#### SEXO A TOPE GRATIS!!!!!!!



URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 7 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

Enter search keyword

GO

# La Psicología de la Salud

Home > Estudios e investigaciones > Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis

## Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis

en lunes, diciembre 07, 2015

La esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno delirante, al descubierto

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por la revista 'Schizophrenia Research', también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

El estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

Como explica el profesor Cervilla Ballesteros, «las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad».

Este trabajo de investigación ha supuesto «un respaldo sin precedentes hasta la fecha» en el diagnóstico de las psicosis, «un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad», explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, «deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)».

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio «ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave», concluyen.

Via elcorreo.com

### LAS ETIQUETAS

[Actualidad](#)

[Adicciones](#)

[Adolescentes - Juventud](#)

[Alimentos](#)

[Ansiedad](#)

[Autoayuda](#)

[Consejos](#)

[Definición](#)

[Depresión](#)

[Ejercicios y deporte](#)

[El artículo](#)

[El síndrome](#)

[Estrés](#)

[Estudios e investigaciones](#)

[Fobias - Miedos](#)

[Hombres](#)

[La angustia](#)

[La autoestima](#)

[La bulimia](#)

[La esquizofrenia](#)

[La psicoterapia](#)

[La Psiquiatría](#)

[Libros](#)

[Los antidepresivos](#)

[Los padres](#)

[Los trastornos psicológicos](#)

[Mujer](#)

[Noticias](#)

[Obsesiones](#)

[Personas mayores](#)

[Psicología](#)

[Psicología Infantil](#)

[Psicología Pareja](#)

[Relajación y meditación](#)

[Salud Mental](#)

[Terapias](#)

### EL ARCHIVO

[diciembre 2015 \(13\)](#)

[noviembre 2015 \(45\)](#)



URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 7 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

Etiquetas: Estudios e investigaciones

Share this article :

STAY TUNED WITH OUR NEWS LETTER



Don't miss out on the latest news, sign up for our Newsletter.



Enter your email...

SignUp

0 comentarios:

[Publicar un comentario en la entrada](#)

Suscribirse a: [Enviar comentarios \(Atom\)](#)

SEGUIDORES

octubre 2015 (52)  
septiembre 2015 (43)  
agosto 2015 (34)  
julio 2015 (30)  
junio 2015 (28)  
mayo 2015 (53)  
abril 2015 (55)  
marzo 2015 (38)  
febrero 2015 (20)  
enero 2015 (29)  
diciembre 2014 (23)  
noviembre 2014 (45)  
octubre 2014 (32)  
septiembre 2014 (54)  
agosto 2014 (27)  
julio 2014 (14)  
junio 2014 (17)  
mayo 2014 (25)  
abril 2014 (29)  
marzo 2014 (21)  
febrero 2014 (18)  
enero 2014 (29)  
diciembre 2013 (22)  
noviembre 2013 (27)  
octubre 2013 (14)  
septiembre 2013 (16)  
agosto 2013 (11)  
julio 2013 (13)  
junio 2013 (9)  
mayo 2013 (21)  
abril 2013 (22)  
marzo 2013 (28)  
febrero 2013 (23)  
enero 2013 (4)  
mayo 2012 (10)  
abril 2012 (10)  
marzo 2012 (18)  
febrero 2012 (16)  
enero 2012 (22)  
diciembre 2011 (15)  
noviembre 2011 (15)  
octubre 2011 (13)  
septiembre 2011 (17)  
agosto 2011 (20)  
julio 2011 (18)  
junio 2011 (19)  
mayo 2011 (17)



URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 7 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

abril 2011 (14)  
marzo 2011 (22)  
febrero 2011 (20)  
enero 2011 (30)  
diciembre 2010 (30)  
noviembre 2010 (33)  
octubre 2010 (7)

#### ENTRADAS POPULARES

**Los efectos psicológicos de un embarazo no deseado en la adolescencia**

La nueva ley del aborto pone sobre la mesa una cuestión ética: ¿Una mujer de 16 años es totalmente capaz de tomar la decisión de abortar? No...

**Los cinco errores que cometemos al luchar contra la ansiedad**

La ansiedad es uno de los males de nuestros días. El estrés, las prisas, las exigencias y la búsqueda de la perfección en todo lo que hace...

**El hábito de morderse**

El hábito de morderse las uñas, síntoma de ansiedad, estrés o tristeza Bien se sabe que las manías nos acompañan desde que somos bebés:...



**Farmacodependencia**

Cuando una persona consume fármacos por motivos distintos a los previstos en un primer momento, o bien en cantidades superiores a la recomen...

**Las frases que más odian escuchar los psicólogos de sus pacientes**

A los psicólogos nos repiten, con cierta frecuencia, como si de un sonsonete se tratará, una serie de frases que no muy por repetidas - y mu...



## Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis, salud mental La esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno delirante, al descubierto

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por la revista 'Schizophrenia Research', también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado

El estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

Como explica el profesor Cervilla Ballesteros, «las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad».

Este trabajo de investigación ha supuesto «un respaldo sin precedentes hasta la fecha» en el diagnóstico de las psicosis, «un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad», explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, «deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)».

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio «ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave», concluyen.



## Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis

salud mental La esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno delirante, al descubierto

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por la revista 'Schizophrenia Research', también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

El estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

Como explica el profesor Cervilla Ballesteros, «las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad».

Este trabajo de investigación ha supuesto «un respaldo sin precedentes hasta la fecha» en el diagnóstico de las psicosis, «un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad», explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, «deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)».

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio «ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave», concluyen.



## Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis

La esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno delirante, al descubierto

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por la revista 'Schizophrenia Research', también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

El estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

Como explica el profesor Cervilla Ballesteros, «las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad».

Este trabajo de investigación ha supuesto «un respaldo sin precedentes hasta la fecha» en el diagnóstico de las psicosis, «un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad», explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, «deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)».

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio «ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave», concluyen.



## Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis

salud mental La esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno delirante, al descubierto

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por la revista 'Schizophrenia Research', también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

El estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

Como explica el profesor Cervilla Ballesteros, «las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad».

Este trabajo de investigación ha supuesto «un respaldo sin precedentes hasta la fecha» en el diagnóstico de las psicosis, «un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad», explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, «deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)».

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio «ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave», concluyen.



## Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por la revista 'Schizophrenia Research', también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado

El estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

Como explica el profesor Cervilla Ballesteros, «las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad».

Este trabajo de investigación ha supuesto «un respaldo sin precedentes hasta la fecha» en el diagnóstico de las psicosis, «un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad», explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, «deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)».

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio «ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave», concluyen.



## Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis

La esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno delirante, al descubierto

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por la revista 'Schizophrenia Research', también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

El estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

Como explica el profesor Cervilla Ballesteros, «las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad».

Este trabajo de investigación ha supuesto «un respaldo sin precedentes hasta la fecha» en el diagnóstico de las psicosis, «un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad», explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, «deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)».

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio «ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave», concluyen.



## Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por la revista 'Schizophrenia Research', también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado

El estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

Como explica el profesor Cervilla Ballesteros, «las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad».

Este trabajo de investigación ha supuesto «un respaldo sin precedentes hasta la fecha» en el diagnóstico de las psicosis, «un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad», explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, «deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)».

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio «ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave», concluyen.



## Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por la revista 'Schizophrenia Research', también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado

El estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

Como explica el profesor Cervilla Ballesteros, «las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad».

Este trabajo de investigación ha supuesto «un respaldo sin precedentes hasta la fecha» en el diagnóstico de las psicosis, «un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad», explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, «deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)».

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio «ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave», concluyen.



# Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis

salud mental La esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno delirante, al descubierto

En el trabajo, publicado por la revista 'Schizophrenia Research', también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado

El estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

Como explica el profesor Cervilla Ballesteros, «las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad».

Este trabajo de investigación ha supuesto «un respaldo sin precedentes hasta la fecha» en el diagnóstico de las psicosis, «un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad», explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, «deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)».

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio «ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave», concluyen.



## Un estudio pionero determina los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis

salud mental La esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno delirante, al descubierto

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por la revista 'Schizophrenia Research', también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

El estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

Como explica el profesor Cervilla Ballesteros, «las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad».

Este trabajo de investigación ha supuesto «un respaldo sin precedentes hasta la fecha» en el diagnóstico de las psicosis, «un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad», explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, «deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)».

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio «ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave», concluyen.



URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 6 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

## Revolución en el diagnóstico de la psicosis

que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios, y exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. / UGRUn estudio del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), dirigido por Jorge Cervilla Ballesteros, catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, muestra la notable mejora en el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante. En el trabajo, publicado por la revista Schizophrenia Research, también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona. Este estudio, pionero en el mundo, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora solo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente. Los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora solo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente. La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria. Un grave trastorno mental. Como explica Cervilla Ballesteros, "las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad". Este trabajo de investigación ha supuesto "un respaldo sin precedentes hasta la fecha" en el diagnóstico de las psicosis, "un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad", explica el autor principal. Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren Muñoz Negro y Cervilla, "deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)". Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio "ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave", concluyen. Referencia bibliográfica: José E. Muñoz-Negro, Inmaculada Ibanez-Casas, Enrique de Portugal, Susana Ochoa, Montserrat Dolz, Josep M. Haro, Miguel Ruiz-Veguilla, Juan de Dios Luna del Castillo, Jorge A. Cervilla. A dimensional comparison between delusional disorder, schizophrenia and schizoaffective disorder. Schizophrenia Research DOI: <http://dx.doi.org/10.1016>



## Investigación e innovación: Entrevista a Jorge Cervilla

La psicosis es una de las enfermedades más graves que existen, pero no la más frecuente. Así, expertos de la Universidad de Granada, en un estudio pionero a nivel mundial, determinan por primer vez los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante. Para profundizar sobre este tema tenemos en Aula Abierta al catedrático del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Granada, Jorge Cervilla.

Este estudio que ha dirigido el profesor Jorge Cervilla se ha desarrollado durante 20 años y dentro de él “hemos mejorado la calidad del diagnóstico, ya que se basaba en la entrevista y tenía sus defectos. Tenemos herramientas diagnósticas que nos permiten hacer un diagnóstico mejor y más fácil”. Para ello, “hemos recogido 550 casos a lo largo de 20 años y hemos hecho un análisis matemático para detectar que tipos de síntomas son los más frecuentes”.

A raíz de este estudio se ha podido encontrar 5 tipos de síntomas “que digamos cubren lo que son las psicosis”. Estos cinco tipos de síntomas “pueden ser positivos, como por ejemplo delirios o alucinaciones; negativos que por ejemplo son apatía y falta de motivación; y luego están los grupos depresión, manía y finalmente síntomas de tipo intelectuales”. Todo esto se traduce en un mejor trato al paciente, “ya que ahora le decimos que síntomas tiene únicamente”.

### Share this:

- Twitter
- Facebook
- 

### Me gusta:

Me gusta Cargando...

### Relacionado



URL: -  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 5 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

## RINCON DE ALBUÑOL



### Páginas

[Página principal](#)  
[Los gestores culturales reconocen descoordinación ...](#)



### Archivo del blog

▼ 2015 (1097)

▼ diciembre (22)

[La ONU pide a España medidas para evitar que una f...](#)

[Cruz Roja destaca una 'bolsa' de más de 500 person...](#)

[Personas con discapacidad demandan "información fá...](#)

[Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de...](#)

[La consejera de Cultura preside en Granada la reun...](#)

[El Planetario renueva sus proyecciones y añade una...](#)

[Ganaderos y pastores de toda Andalucía reclaman en...](#)

[Medio Ambiente](#)

SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE DE 2015

### Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granada revolucionan el diagnóstico de la psicosis infocostatropical.com



Un estudio pionero a nivel mundial determina por primera vez científicamente los síntomas de los tres tipos más

frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por la revista Schizophrenia Research, también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

Este estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un



[Nuevo Ambiente  
avanza los  
trámites para  
ejecutar l...](#)

[Las irregularidades  
del contrato de  
Aguas de la Co...](#)

[Los residentes del  
primer edificio  
con geotermia  
a...](#)

[El IBI social sólo  
beneficia a 92  
familias en  
toda...](#)

[Los dibujos 'ocultos'  
de la Alhambra  
granadahov.co...](#)

[El impacto del  
Cambio Climático  
sobre la salud  
cro...](#)

[Cultura.- Granada  
creará nuevas  
infraestructuras  
p...](#)

[Zuckerberg  
destinará a obras  
benéficas el 99%  
de s...](#)

[La Junta inicia el  
arreglo de los  
barrancos de  
Alb...](#)

[Salud conciencia  
sobre la gran  
importancia de la  
v...](#)

[Empleo, formación  
y turismo para la  
nueva etapa de...](#)

[Salud alerta sobre  
la "banalización"  
del sida entr...](#)

[Al otro lado de la  
tragedia  
granadahov.com](#)

[¿Quién robaría los  
datos de tu salud?  
elmundo](#)

[Experiencias  
inmersivas en el  
Parque de las  
Cienci...](#)

- noviembre (118)
- octubre (118)
- septiembre (90)
- agosto (92)
- julio (102)
- junio (101)

...comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

### Un grave trastorno mental

Como explica el profesor Cervilla Ballesteros, "las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad".

Este trabajo de investigación ha supuesto "un respaldo sin precedentes hasta la fecha" en el diagnóstico de las psicosis, "un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad", explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, "deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)".

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio "ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave", concluyen.

Publicado por [J. Gabriel Rodríguez](#) en [1:56](#)

No hay comentarios:

[Publicar un comentario en la entrada](#)



URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 5 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

- mayo (114)
- abril (94)
- marzo (103)
- febrero (70)
- enero (73)
- 2014 (1218)
- 2013 (2164)
- 2012 (1273)
- 2011 (972)
- 2010 (333)
- 2009 (32)

Suscribirse a: [Enviar comentarios \(Atom\)](#)

### Datos personales

 [J. GABRIEL  
RODRIGUEZ](#)

ALBUÑOL, GRANADA  
SOY UN GRAN  
AFICIONADO A LA  
LECTURA, POR ELLO  
DEDICO MI BLOG A  
TODOS AQUELLOS QUE  
COMO YO LEEN !! Y  
DEDICO ESTE BLOG A  
TODOS AQUELLOS/AS  
QUE ESTEN  
INTERESADOS EN TODAS  
LAS NOTICIAS QUE HAY  
SOBRE SU PUEBLO.

[Ver todo mi perfil](#)

---

## Mi lista de blogs

Loading...





URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 5 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

PÁGINA PRINCIPAL

## Actualidad y Noticias de Salud

12 sábado, 5 de diciembre de 2015

### Investigadores españoles 'revolucionan' el diagnóstico de las psicosis

Un estudio pionero a nivel mundial determina por primera vez científicamente los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado en la revista «Schizophrenia Research», también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

Este estudio ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

#### Un grave trastorno mental

Como explica el profesor Cervilla Ballesteros, «las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad».

Este trabajo de investigación ha supuesto «un respaldo sin precedentes hasta la fecha» en el diagnóstico de las psicosis, «un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad», explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren Muñoz Negro y Cervilla, «deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maniaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)».

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos «ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave», concluyen.

Via [abc.es](#)



Etiquetas: [Psicología](#)

#### Etiquetas

- [Actualidad y Noticias \(164\)](#)
- [Adolescentes \(7\)](#)
- [Alzheimer \(3\)](#)
- [Artículos \(39\)](#)
- [Bebes \(3\)](#)
- [Bucodental \(4\)](#)
- [Buenas Noticias \(1\)](#)
- [Cáncer \(20\)](#)
- [Cardiovascular \(3\)](#)
- [Consejos \(7\)](#)
- [Ejercicio \(21\)](#)
- [El cáncer \(7\)](#)
- [El colesterol \(3\)](#)
- [El dolor \(5\)](#)
- [Enfermedades \(8\)](#)
- [Estudios \(141\)](#)
- [Hombres \(5\)](#)
- [Investigación \(33\)](#)
- [La Alimentación y Nutrición \(38\)](#)
- [La sexualidad \(1\)](#)
- [Las personas mayores \(11\)](#)
- [Mujeres \(36\)](#)
- [Niños - Niñas \(20\)](#)
- [Obesidad \(1\)](#)
- [Parkinson \(1\)](#)
- [PREVENCIÓN \(1\)](#)
- [Psicología \(17\)](#)
- [Terapias \(1\)](#)

#### El archivo

- [diciembre 2015 \(2\)](#)
- [noviembre 2015 \(19\)](#)
- [octubre 2015 \(20\)](#)
- [septiembre 2015 \(19\)](#)
- [agosto 2015 \(16\)](#)
- [julio 2015 \(11\)](#)
- [junio 2015 \(19\)](#)
- [mayo 2015 \(25\)](#)
- [abril 2015 \(25\)](#)
- [marzo 2015 \(19\)](#)
- [febrero 2015 \(15\)](#)
- [enero 2015 \(14\)](#)
- [diciembre 2014 \(12\)](#)
- [noviembre 2014 \(16\)](#)



URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 5 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

0 comentarios:

[Publicar un comentario en la entrada](#)

[Página principal](#)

[Entrada antigua](#)

noviembre 2014 (17)  
[octubre 2014 \(21\)](#)  
[septiembre 2014 \(20\)](#)  
[agosto 2014 \(2\)](#)  
[julio 2014 \(5\)](#)  
[junio 2014 \(5\)](#)  
[mayo 2014 \(17\)](#)  
[abril 2014 \(21\)](#)  
[marzo 2014 \(17\)](#)  
[febrero 2014 \(19\)](#)  
[enero 2014 \(29\)](#)  
[diciembre 2013 \(23\)](#)  
[noviembre 2013 \(28\)](#)  
[octubre 2013 \(18\)](#)  
[septiembre 2013 \(17\)](#)  
[agosto 2013 \(14\)](#)  
[julio 2013 \(16\)](#)  
[junio 2013 \(11\)](#)  
[mayo 2013 \(21\)](#)  
[abril 2013 \(24\)](#)  
[marzo 2013 \(37\)](#)  
[febrero 2013 \(2\)](#)

#### Entradas populares

[Un test genético incompleto conduce a una terapia inadecuada en el 50% de los cánceres](#)

Una medicina personalizada oncológica precisa debe incluir la secuenciación del genoma del tumor pero también la del ADN del tejido normal d...

[El consumo moderado de cerveza](#)

El consumo moderado de cerveza puede mejorar la respuesta inmunitaria, según estudio El consumo moderado de cerveza podría conllevar una mej...

[La publicidad de alimentos y bebidas en televisión incluirá mensajes saludables durante todo el año 2014](#)

La campaña Havisia refleja el compromiso del Gobierno en la lucha contra el exceso de peso y el sedentarismo. Con esta actuación se pone en v...

[Un estudio relaciona eccema, rinitis y asma en niños](#)

Un estudio europeo con más de 20.000 niños ha descubierto que la coexistencia del eccema, la rinitis y el asma en el mismo niño es mucho más...

[Berta, una niña con una enfermedad rara que afecta al cromosoma 22](#)

El síndrome de Phelan McDermid, una enfermedad rara, está originado por pequeñas pérdidas de material genético



URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 5 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

en el cromosoma 22. Los niños...

#### [Investigaciones prometen buenas noticias sobre el Alzheimer](#)

Una de ellas señala que su riesgo se reduciría si se retrasa la jubilación. Por fin hay buenas noticias sobre el Alzheimer: la frecuencia de...

#### [Los peligros del fracking para la salud](#)

Los gases que se inyectan en el subsuelo actúan como disruptores endocrinos. Los ecologistas también alertan del peligro de contaminación...

#### [La ira no es el mejor compañero de nuestro corazón](#)

Los ataques de ira pueden provocar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otros problemas cardiovasculares en las siguientes dos ...

#### [El engaño de los suplementos de omega 3](#)

La FEC respalda un anuncio de suplementos que no cuentan con el suficiente aval científico. No está demostrado que los suplementos de...

#### [Beber más de 1 refresco azucarado al día aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca](#)

Se sabe que un consumo excesivo está relacionado con obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión. Cada vez hay más estudios que advierten sobre...



URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 5 Diciembre, 2015


[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

## herencia genética y enfermedad

Los avances de la medicina en el campo de la genética, por ende de la herencia, están modificando el paisaje del conocimiento médico de las enfermedades. Este BLOG intenta informar acerca de los avances proveyendo orientación al enfermo y su familia así como información científica al profesional del equipo de salud de habla hispana.

**AYÚDANOS A SEGUIR  
INFORMÁNDOSE Y  
PERMÍTENOS AYUDAR A  
OTROS**

### TELÓMEROS



la llave de las ciencias médicas en los próximos cien años

### herencia genética y enfermedad

Cargando...

### AddThis



### Translate

### Archivo del blog

▼ 2015 (11009)

▼ diciembre (180)

- Un defecto en las mitocondrias del corazón causa m...
- Una nueva inmunoterapia podría mejorar el tratamie...
- "De momento, la erradicación total del VIH es impo...
- [Revolución en el diagnóstico de la psicosis / Noti...](#)
- Mujeres y hombres... y sus cerebros / Reportajes / ...
- Obesidad y cirugía bariátrica inducen cambios epig...
- La hidratación, esencial para mantener una nutrici...
- Una terapia combinada mejora el pronóstico en LLC ...
- Uno de cada dos españoles ha sufrido en el último ...
- Cómo abordar el estrés durante el tratamiento del ...
- Mantener las emociones bajo control gracias a la n...
- Los nuevos casos de diabetes entre los estadounid...
- Correr largas distancias afecta a las articulacion...
- OMS | Llamamiento de la OMS a favor de una interve...
- OMS | Principales mensajes de la OMS para la COP21...

sábado, 5 de diciembre de 2015

## Revolución en el diagnóstico de la psicosis / Noticias / SINC

[Revolución en el diagnóstico de la psicosis / Noticias / SINC](#)

# sinc

La ciencia es noticia

## Revolución en el diagnóstico de la psicosis

Una investigación española, publicada en la revista *Schizophrenia Research*, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante. Este trabajo ayudará a personalizar la diagnosis y tratamiento de estos pacientes.

UGRdivulga | 04 diciembre 2015 09:26



Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios, y exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. / UGR

Un estudio del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), dirigido por Jorge Cervilla Ballesteros, catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, muestra la notable mejora en el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por la revista *Schizophrenia Research*, también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

Este estudio, pionero en el mundo, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista



URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 5 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

OMS | Detección de la hepatitis C y atención y tra...  
Trombosis venosa profunda: MedlinePlus en español  
Cáncer de garganta: MedlinePlus en español  
OMS | Naciones Unidas: la mortalidad materna se ha...  
OMS | Informe OMS/UNICEF: se ha alcanzado la meta ...  
OMS | La vacunación contra el sarampión ha permiti...  
OMS | Un nuevo informe pone de relieve cuatro form...  
OMS | Encuesta en varios países de la OMS muestra ...  
OMS | Informe de la OMS señala que los niños menor...  
OMS | Se calcula que dos terceras partes de la pob...  
La contaminación producida al quemar carbón es la ...  
Mejora la supervivencia de las pacientes de cáncer...  
Las noticias negativas sobre las estatinas se asoc...  
Que las personas mayores caminen con lentitud podr...  
¿La densidad del seno es un factor de riesgo de cá...  
Una IRM puede detectar señales iniciales de la art...  
Una mamografía falso positiva podría apuntar a un ...  
Una nueva marihuana potente podría causar daños al...  
Los beneficios para el cerebro de las personas may...  
Peligro de plomo en algunos juguetes para las fies...  
Trastornos hemorrágicos en las mujeres  
La vacuna contra el VPH también se recomienda para...  
Dra. Marisa Aizenberg: Cada año mueren 420.000 per...  
Candidiasis invasiva ► IntraMed - Artículos - Cand...  
Anomalías físicas en la resonancia magnética fetal...  
Comunicados de Prensa > La FDA aprueba nuevo trata...  
La obesidad en la juventud podría dañar al corazón...  
Emergencia doméstica con productos químicos | FEMA...  
Publications | National Institute on Alcohol Abuse...  
Nuevos enlaces en MedlinePlus: Exámenes ginecológ...  
¿Tiene demasiadas ganas de beber café? La terapia ...  
Vinculan el smog con las enfermedades cardíacas en...  
Uno de cada ocho adultos estadounidenses sigue ten...  
Tronarse los nudillos se ve como unos fuegos artif...  
Quizá no haya que tomar una pastilla para prevenir...  
Los nuevos casos de diabetes entre los estadounide...  
Los dispositivos para la apnea del sueño reducen l...  
Unos impuestos más altos sobre los cigarrillos se ...  
El tratamiento de la tuberculosis resistente se re...  
La Comisión Europea aconseja limitar las grasas 't...  
Desvelan los secretos del dolor | Ciencia | EL PAÍ...  
Muere por tosferina un bebé de un mes y diez días ...  
Obesidad y cirugía bariátrica inducen cambios epig...  
La inmunoterapia funcionaría sólo en pacientes VIH...  
La familia, agente terapéutico angular en salud me...  
Una de cada 10 personas enferman cada año por come...  
Una marcha lenta en personas mayores puede ser un ...  
La pancreatometomía distal laparoscópica requiere

de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora solo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

### *Los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora solo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente*

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

#### **Un grave trastorno mental**

Como explica Cervilla Ballesteros, "las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad".

Este trabajo de investigación ha supuesto "un respaldo sin precedentes hasta la fecha" en el diagnóstico de las psicosis, "un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad", explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren Muñoz Negro y Cervilla, "deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)".

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio "ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave", concluyen.

#### **Referencia bibliográfica:**

José E. Muñoz-Negro, Inmaculada Ibanez-Casas, Enrique de Portugal, Susana Ochoa, Montserrat Dolz, Josep M. Haro, Miguel Ruiz-Veguilla, Juan de Dios Luna del Castillo, Jorge A. Cervilla. A dimensional comparison between delusional disorder, schizophrenia and schizoaffective disorder. *Schizophrenia Research* DOI: <http://dx.doi.org/10.1016>

Publicado por salud equitativa en 7:59

**No hay comentarios:**

**Publicar un comentario en la entrada**

[Entrada más reciente](#)

[Página principal](#)

[Entrada antigua](#)

Suscribirse a: [Enviar comentarios \(Atom\)](#)



URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 5 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

E...

Un defecto en la mitocondria causa insuficiencia c...

Los hombres comen más cuando están sentados a la m...

Encuentran un gen del sueño relacionado con la ins...

Investigadores descubren la interacción esencial e...

La cardiopatía en el embarazo va en aumento :: El ...

Planificar la transición en la etapa final de la v...

**Los pacientes con cáncer sufren alteraciones del s...**

Día del médico

Hallan una manera más precisa para cultivar osteoc...

**Novartis Oncology presenta su última iniciativa so...**

Una nueva técnica revela las causas del envejeciml...

Nuevas aplicaciones de resonancia magnética reduce...

Las variaciones genéticas dentro de un mismo tumor...

Los jóvenes están piamente desinformados sobre e...

Rare Disease Day © 2015 - Maximising Social Media ...

Inscripcion | ECRD 2016 : The European Conference o...

EURORDIS Summer School for patient advocates

Grant Application: Convocatoria para solicitar una...

MIPS - Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor...

UN Enable - International Day of Persons with Disa...

Téléthon 2015 : 4 et 5 décembre | AFM-Téléthon

EURORDIS Photo Contest 2015

15 year old living with TRAPS - Tumor Necrosis Fac...

Una pastilla diaria puede prevenir el VIH - Signos...

Rare Diseases International

Prepararse para las Redes Europeas de Referencia

Trulicity, de Lilly, opción semanal para el contro...

La atención diabética adaptada personalmente reduc...

Disponible en España la terapia estándar para cier...

La innovadora estrategia Polypil Cardiovascular e...

La UE advierte de que en la mayoría de países no h...

La pérdida de peso protege de la degeneración del ...

SEPAR presenta ¡Hola EPOCI, una web dedicada a los...


Ai fin amanece - trailer

Ai fin amanece - Dr. Carlos Damin

"Ai fin Amanece", una presentación para no olvidar...

- noviembre (985)
- octubre (1084)
- septiembre (1002)
- agosto (860)
- julio (1025)
- junio (1002)
- mayo (1014)
- abril (970)
- marzo (1061)
- febrero (907)
- enero (919)
- 2014 (11224)
- 2013 (11115)
- 2012 (9955)
- 2011 (7885)
- 2010 (6227)
- 2009 (2565)

## NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA





URL:  
PAÍS: España  
TARIFA: 2 €

UUM: -  
UUD: -  
TVD: -  
TMV: -



► 5 Diciembre, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online



Ella me ha guiado a lo largo de mi vida

## Páginas vistas en total

### Datos personales



salud equitativa

ver historia personal en: [www.cerasale.com.ar](http://www.cerasale.com.ar)  
[dado de baja por la Cancillería Argentina por temas políticos, propio de la censura que rige en nuestro medio] // [www.revistamedicos.com.ar](http://www.revistamedicos.com.ar) // [www.quorumtuc.com.ar](http://www.quorumtuc.com.ar) // [www.sectorsalud.com.ar](http://www.sectorsalud.com.ar) // [www.maimonides.edu](http://www.maimonides.edu) // [weblog.maimonides.edu/farmacia/archives/UM\\_informe\\_Autoevaluacion\\_FyB.pdf](http://weblog.maimonides.edu/farmacia/archives/UM_informe_Autoevaluacion_FyB.pdf) - // [weblog.maimonides.edu/farmacia/archives/0216\\_Admin\\_FarmEcon.pdf](http://weblog.maimonides.edu/farmacia/archives/0216_Admin_FarmEcon.pdf) - // [www.documentalistas.org.ar](http://www.documentalistas.org.ar) // [www.cpcesfe2.org.ar](http://www.cpcesfe2.org.ar) // [www.nogracias.eu](http://www.nogracias.eu) // [www.estensorome.com.ar](http://www.estensorome.com.ar) // [www.cuautitlan.unam.mx/descargas/licenciaturas/bqd/plandestudio\\_bqd/](http://www.cuautitlan.unam.mx/descargas/licenciaturas/bqd/plandestudio_bqd/) // [www.latamjpharm.org/trabajos/25/2/LAJOP\\_25\\_2\\_6\\_1\\_M4M6Z9746D.pdf](http://www.latamjpharm.org/trabajos/25/2/LAJOP_25_2_6_1_M4M6Z9746D.pdf) // [www.nogracias.eu/v\\_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=](http://www.nogracias.eu/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=) // [www.colfarse.com.ar](http://www.colfarse.com.ar) // [www.proz.com/kudoz/english\\_to\\_spanish/art\\_lite\\_rary/523942-key\\_factors.html](http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/art_lite_rary/523942-key_factors.html) - 65k - // [www.llave.connmed.com.ar/porta/noticias\\_vernoticia.php?codigonoticia=17715](http://www.llave.connmed.com.ar/porta/noticias_vernoticia.php?codigonoticia=17715) // [www.frusculleda.com.ar/homepage/espanol/activities\\_teaching.htm](http://www.frusculleda.com.ar/homepage/espanol/activities_teaching.htm) // <http://www.on24.com.ar/nota.aspx?idNot=36331>  
||

Ver todo mi perfil

### SÍMBOLO PATRIO



ARGENTINA

### SÍMBOLO ECOLÓGICO NACIONAL



FLOR DE CEIBO



REGÍSTRATE  
|  
INICIAR SESIÓN  
hola,  
Suscripción PDF  
Cerrar sesión

Sábado, 5 de diciembre de 2015

GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA ESPECIALES MAPA WE

# Granada Hoy

## GRANADA

PORTADA GRANADA PROVINCIA DEPORTES ANDALUCÍA 20D ACTUALIDAD TECNO CULTURA TV SALUD OPINIÓN SEMANA SANTA

Granada Hoy, Noticias de Granada y su Provincia ► Granada ► Un acercamiento a la psicosis

### Un acercamiento a la psicosis

Científicos de la UGR determinan por primera vez los síntomas de la esquizofrenia, y los trastornos esquizoafectivo y delirante

R. G. GRANADA | ACTUALIZADO 05.12.2015 - 01:00

0 comentarios 0 votos  
COMPARTIR



En el estudio han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.

Un estudio del grupo de investigación 'Cibersam', dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado por primera vez los síntomas de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante. Según informó la UGR en un comunicado, en el trabajo, publicado por la revista *Schizophrenia Research*, también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona. Este estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente. La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad y las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado.

Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria, tal y como ha explicado el profesor Cervilla Ballesteros quien ha asegurado "las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad". Este trabajo de investigación ha supuesto "un respaldo sin precedentes hasta la fecha" en el diagnóstico de las psicosis, "un paso de gigante" que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad", explica el autor principal.

Además, el artículo proporciona las claves para redefinir los subtipos de dichas psicosis que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, "deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)". Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio "ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave", concluyen.

0 comentarios 0 votos

0 COMENTARIOS

Ver todos los comentarios

PUBLICIDAD

Consúltanos, somos  
**EXPERTOS**  
en Planes de Pensiones

- X Rentabilidad
- X Asesoramiento Permanente
- X Y magníficos regalos hasta el 31/12/2015



**MUNDO RURAL** EN RED

MUNDO RURAL GRANADA  
Consulta toda la actualidad del mundo rural

PUBLIRREPORTAJE



Las instalaciones ubicadas en la Calle Melchor Almagro.

### Gran Capitán, oficinas para emprender

El Centro de Trabajo y Empresas ofrece una solución económica para empezar una aventura empresarial con puestos de trabajo conjunto e individual, sala de reuniones y otras comodidades.

### GRANADA

CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO Elecciones Municipales 2015

CONCEJAL

ALCAL

José Torres Ibarra





### Interactivo: El nuevo Ayuntamiento de Granada

La composición del Consistorio partido a partido y concejal a concejal, así como de las principales ciudades andaluzas.

AYER Y HOY



José Luis Delgado

### El poeta Manuel Benítez Carrasco también fue niño

Con la publicación de la antología poética referida a la infancia asistimos al capítulo más entrañable de la extensa obra del poeta albaicinerino El Teatro Isabel la Católica fue testigo

PUBLICIDAD

<b>CUADROS</b> Anales - Olivos Grabados	<b>ESULTURAS</b> Tallas en Madera Mármol - Bronce - Marfil	<b>CERÁMICAS</b> De colecciónismo y Bólicas
<b>PORCELANAS</b> Chinas - Europeas y Orientales	<b>RELOJES</b> De Sobremesa - Pared De Puhosa y Baballo	<b>TEXTIL</b> Tapices - Mantones Mantelerías y Encajes
<b>PLATA</b> Valores en plata	<b>MUEBLES</b> Burgueses Clásicos - Vitruvianos Espejos - Comodinas, etc	<b>JOYAS Y VINTAJE</b> Lacis Volutas - Hornos - Corales, etc...

PUBLICIDAD

**movistar**

Contrata ya **FUSIÓN+**

**FÚTBOL  
DEPORTES  
CINE  
SERIES**

**Paquete PREMIUM ¡Un mes gratis!**

900 200 644

Contrátalo sin permanencia

PUBLICIDAD

Blogs





 **LA CISTERNA**  
de Luis Muñoz

 **ARGUMENTOS PTAPIAS**

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

[GALERÍAS GRÁFICAS](#) | [CANALES](#) | [BLOGS](#) | [PARTICIPACIÓN](#) | [HEMEROTECA](#) | [ESPECIALES](#) | [MAPA WE](#)

[PORTADA](#) | [GRANADA](#) | [PROVINCIA](#) | [DEPORTES](#) | [ANDALUCÍA](#) | [20D](#) | [ACTUALIDAD](#) | [TECNO](#) | [CULTURA](#) | [TV](#) | [SALUD](#) | [OPINIÓN](#) | [SEMANA SANTA](#)

© Joly Digital | Calle Luis Amador, 26. Edif. Cámara de Comercio | [Aviso legal](#) | [Quiénes somos](#) | [RSS](#) 

[www.diariodecadiz.es](#) | [www.diariodesevilla.es](#) | [www.diariodejerez.es](#) | [www.europasur.es](#) | [www.eldiadicordoba.es](#) | [www.huelvainformacion.es](#) | [www.gradahoy.com](#)  
| [www.malagahoy.es](#) | [www.elalmeria.es](#) | [www.anuariojolyandalucia.com](#) | [www.saberuniversidad.es](#) | [www.mundoruralenred-sevilla.es](#) | [www.mundoruralenred-cadiz.es](#)  
| [www.mundoruralenred-campodegibraltar.es](#) | [www.mundoruralenred-jerez.es](#) | [www.mundoruralenred-malaga.es](#) | [www.mundoruralenred-huelva.es](#) | [www.mundoruralenred-almeria.es](#)  
| [www.mundoruralenred-cordoba.es](#) | [www.mundoruralenred-granada.es](#)

**SITIOS RECOMENDADOS**  
[Vuelos Baratos](#) | [Ver Hoteles en Granada con Rumbo](#)



# Granada en la red . com

## HEADLINES

Científicos de la UGR corroboran diferencias significativas entre los tres tipos más importantes de psicosis

Ciencia Cultura Deportes Negocios Ocio Política Sociedad Turismo Universidad

Home

Published On: Sab, dic 5th, 2015

Ciencia / Portada | By Redacción/Agencias/prensa

COMMENTS CATEGORIES TAGS

## Científicos de la UGR corroboran diferencias significativas entre los tres tipos más importantes de psicosis

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, Jorge Cervilla Ballesteros, ha mejorado notablemente el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de psicosis que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno delirante.

En el trabajo, publicado por la revista *Schizophrenia Research*, también participa José Eduardo Muñoz Negro, de la Unidad de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Granada, y en él han participado 550 pacientes con psicosis de Granada y Barcelona.



Este estudio, pionero a nivel mundial, ha corroborado empíricamente que, desde el punto de vista de sus síntomas mentales, los tres tipos de psicosis son significativamente distintos, algo que hasta ahora sólo estaba apoyado por definiciones teóricas no demostradas científicamente.

La psicosis hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. Las personas que experimentan psicosis

pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria.

### Un grave trastorno mental

Como explica el profesor Cervilla Ballesteros, "las psicosis son los trastornos mentales más graves que se manifiestan con síntomas en que el paciente sufre distorsiones en su percepción o entendimiento de la realidad".

Este trabajo de investigación ha supuesto "un respaldo sin precedentes hasta la fecha" en el diagnóstico de las psicosis, "un paso de gigante que, además, tiene importantes implicaciones para las prestaciones sociales y sanitarias que se dan a los pacientes en la actualidad", explica el autor principal.



Corroboran de manera empírica que los tres tipos más importante de psicosis son significativamente distintos desde el punto de vista de sus síntomas mentales que, como sugieren los doctores Muñoz Negro y Cervilla, "deben ser perfilados en función de la intensidad encontrada en las distintas dimensiones de síntomas (maníaca, negativa, depresiva, positiva y cognitiva)".

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos obtenidos por la UGR y el Hospital Clínico San Cecilio "ayudarán a personalizar el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de pacientes con trastorno mental grave", concluyen.

pablo on Diccionario granaino

pablo on Diccionario granaino

redaccion on Diccionario granaino

redaccion on Diccionario granaino

Manuel on Diccionario granaino

- Andalucía sin tópicos
- Cajón de sastre
- Ciencia
- Cultura
- Deportes
- Negocios
- Ocio
- Política
- Portada
- Sociedad
- Titulares
- Turismo
- Universidad

alhambra Ahendín

Alpujarra Armilla artes Banco de Alimentos CD

Universidad de Granada ciencia

ciencias concierto conferencia

## Últimas noticias

- Científicos de la UGR corroboran diferencias significativas entre los tres tipos más importantes de psicosis
- Montefrío organiza una ruta guiada para mostrar a los turistas sus mejores vistas
- Científicos del IAA y la Universidad de Granada cuestionan los resultados obtenidos hasta ahora en el estudio de estrellas pulsantes
- EQUO denuncia la postura de PSOE, PP y C's ante el fracking en Andalucía
- La Junta se pone las medallas de las subvenciones al voluntariado y después no las paga
- Exposición en el Parque de las Ciencias: 'SOS. La ciencia de prevenir'
- Un estudio demuestra que la infidelidad es la ofensa más difícil de perdonar
- Las casas de los primeros cristianos que ocuparon la Alhambra en 1492
- ¿Trabajadores cualificados en Granada? Todos los que quiere el sector de turismo



**Referencia bibliográfica:**

*A dimensional comparison between delusional disorder, schizophrenia and schizoaffective disorder*

José E. Muñoz-Negro, Inmaculada Ibanez-Casas, Enrique de Portugal, Susana Ochoa, Montserrat Doiz, Josep M. Haro, Miguel Ruiz-Veguilla, Juan de Dios Luna del Castillo, Jorge A. Cervilla

*Schizophrenia Research*

DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2015.10.039>

... que quieras el detalle de tu mano.

► [570 abogados para víctimas de violencia de género en Granada](#)


## Sitios web de Lexur

[Lexur Editorial](#) | [Lukor.com](#) | [Lukor.net](#) | [Solo Ciencia](#) | [Web de hogar](#)


### Related News



[Montefrío organiza una ruta guiada para mostrar a los turistas sus mejores vistas](#)



[Científicos del IAA y la Universidad de Granada cuestionan los resultados obtenidos hasta ahora en el estudio de estrellas pulsantes](#)



[EQUO denuncia la postura de PSOE, PP y C's ante el fracking en Andalucía](#)



[Exposición en el Parque de las Ciencias: 'SOS. La ciencia de prevenir'](#)

### Leave a comment

Your Name... (Required)

Your Email... (Will not be published) (Required)

Your Website... (Optional)

Text area for comment input.

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strong>

[Submit Comment](#)



Otro sitio web de **Mauricio Luque**

SEARCH NEWS - TYPE KEYWORD & HIT ENTER





URL: twitter.com

FOLLOWERS: 1075

PAÍS: Desconocido

TARIFA: 3 €

AUTOR: Granada Tecnológica



► 7 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

## **#Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <https://t.co/PTh4jk8ZQ0> #Salud**

#Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis  
<https://t.co/PTh4jk8ZQ0> #Salud



URL: twitter.com  
PAÍS: Desconocido  
TARIFA: 43 €  
AUTOR: SaluDigital.es

FOLLOWERS: 14237



► 7 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

## RT @GranadaTIC: Científicos de la UGR y Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <https://t.co/NWFAIz5eqs>

RT @GranadaTIC: Científicos de la UGR y Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <https://t.co/NWFAIz5eqs>



URL: twitter.com

FOLLOWERS: 636

PAÍS: Desconocido

TARIFA: 2 €

AUTOR: CUS, salut i consum



► 7 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

## **RT @SaluDigital\_es: RT @GranadaTIC: Científicos de la UGR y Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <https://t.co/NWFAIz5eqs>**

RT @SaluDigital\_es: RT @GranadaTIC: Científicos de la UGR y Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <https://t.co/NWFAIz5eqs>



URL: twitter.com

FOLLOWERS: 1072

PAÍS: Desconocido

TARIFA: 3 €

AUTOR: Granada Tecnológica



► 6 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

## **#Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <https://t.co/3sRzYFbjs8> #Salud**

#Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <https://t.co/3sRzYFbjs8> #Salud



URL: twitter.com  
PAÍS: Desconocido  
TARIFA: 5 €  
AUTOR: Ciencia y Cultura

FOLLOWERS: 1618



► 6 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

## **RT @GranadaTIC: #Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <https://t.co/JeFP5yTjQ8> #Salud**

RT @GranadaTIC: #Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <https://t.co/JeFP5yTjQ8> #Salud



URL: twitter.com

FOLLOWERS: 1618

PAÍS: Desconocido

TARIFA: 5 €

AUTOR: Ciencia y Cultura



► 6 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

## **RT @manbayona: Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granada y el diagnóstico de la psicosis - <https://t.co/w29EQBfWue> via @granadadigital**

RT @manbayona: Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granada y el diagnóstico de la psicosis - <https://t.co/w29EQBfWue> via @granadadigital



URL: twitter.com

FOLLOWERS: 1070

PAÍS: Desconocido

TARIFA: 3 €

AUTOR: Granada Tecnológica



► 5 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

## **#Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <https://t.co/JeFP5yTjQ8> #Salud**

#Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <https://t.co/JeFP5yTjQ8> #Salud



URL: twitter.com  
PAÍS: Desconocido  
TARIFA: 8 €  
AUTOR: Manuel Bayona

FOLLOWERS: 2531



► 5 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

## **Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granada y el diagnóstico de la psicosis - <https://t.co/w29EQBfWue> via @granadadigital**

Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granada y el diagnóstico de la psicosis - <https://t.co/w29EQBfWue> via @granadadigital



URL: twitter.com  
PAÍS: Desconocido  
TARIFA: 22 €  
AUTOR: UGRdivulga

FOLLOWERS: 7167



► 5 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

## **RT @GranadaTIC: #Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <https://t.co/JeFP5yTjQ8> #Salud**

RT @GranadaTIC: #Científicos de la #UGR y el #Hospital San Cecilio de #Granada revolucionan el diagnóstico de la #Psicosis <https://t.co/JeFP5yTjQ8> #Salud



URL: twitter.com  
PAÍS: Desconocido  
TARIFA: 2 €  
AUTOR: Ant.P

FOLLOWERS: 588



► 5 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

## **RT @manbayona: Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granada y el diagnóstico de la psicosis - <https://t.co/w29EQBfWue> via @granadadigital**

RT @manbayona: Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granada y el diagnóstico de la psicosis - <https://t.co/w29EQBfWue> via @granadadigital



URL: twitter.com  
PAÍS: Desconocido  
TARIFA: 22 €  
AUTOR: UGRdivulga

FOLLOWERS: 7167



► 5 Diciembre, 2015

[Pulse aquí para acceder a la versión online](#)

## **RT @manbayona: Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granada y el diagnóstico de la psicosis - <https://t.co/w29EQBfWue> via @granadadigital**

RT @manbayona: Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granada y el diagnóstico de la psicosis - <https://t.co/w29EQBfWue> via @granadadigital



[Todo](#)
[Imágenes](#)
[Noticias](#)
[Vídeos](#)
[Maps](#)
[Más ▾](#)


[Todas las noticias ▾](#)
[Última semana ▾](#)
[Ordenados por fecha ▾](#)
[Mostrar duplicados ▾](#)
[Borrar](#)


ileon.com - Infor...

### Un estudio descubre los síntomas de los tres tipos más fr...

[Diario Médico](#) - hace 12 horas

... que se publica en Schizophrenia Research, determina científicamente por primera vez los síntomas de los tres tipos más frecuentes de **psicosis** que existen: ...



### Revolución en el diagnóstico de la psicosis

[AIM Digital](#) - 7 dic. 2015

Revolución en el diagnóstico de la **psicosis** ... catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, ...



### Revolución en el diagnóstico de la psicosis

[ileon.com - Información de León](#) - 7 dic. 2015

Las personas que experimentan **psicosis** pueden presentar alucinaciones o ... catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de Salud Mental del ...



### Revolución en el diagnóstico de la psicosis

[Noticias de la Ciencia y la Tecnología](#) - 7 dic. 2015

... catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de Salud Mental del ... frecuentes de **psicosis** que existen: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y ...



### Revolución en el diagnóstico de la psicosis

[Noticias de la Ciencia y la Tecnología](#) - 7 dic. 2015

... catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de Salud Mental del ... notable mejora en el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de **psicosis** ...

### Revolución en el diagnóstico de la psicosis

[Noticias de la Ciencia y la Tecnología](#) - 7 dic. 2015

... catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de Salud Mental del ... notable mejora en el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de **psicosis** ...



### Científicos de la UGR corroboran diferencias significativas...

[Granada en la red](#) - 4 dic. 2015

... dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de ... La **psicosis** hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o ...

### Un acercamiento a la psicosis

[Granada Hoy](#) - 4 dic. 2015

Un estudio del grupo de investigación 'Cibersam', dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San ...



### España revoluciona el diagnóstico de la psicosis

[Ibercampus.es](#) - 4 dic. 2015

España revoluciona el diagnóstico de la **psicosis** ... por Jorge Cervilla Ballesteros, catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de Salud Mental del ...

[España revoluciona el diagnóstico de la psicosis](#)

[Ibercampus.es](#) - 4 dic. 2015

España revoluciona el diagnóstico de la psicosis ... por Jorge Cervilla Ballesteros, catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de Salud Mental del ...

Estar informado de los resultados de **"Universidad de Granada" psicosis**.

Crear alerta

1 2 3 4 [Siguiete](#)


La selección y la colocación de artículos en esta página se ha determinado automáticamente mediante un programa informático. La fecha y la hora que aparecen muestran cuándo se ha actualizado o se ha añadido un artículo a Google Noticias.

---

[Ayuda](#) [Danos tu opinión](#) [Privacidad](#) [Condiciones](#)



[Todo](#)
[Imágenes](#)
[Noticias](#)
[Vídeos](#)
[Maps](#)
[Más ▾](#)


[Todas las noticias ▾](#)
[Última semana ▾](#)
[Ordenados por fecha ▾](#)
[Mostrar duplicados ▾](#)
[Borrar](#)


### [Determinan por primera vez síntomas de los tres principal...](#)

[Republica.com](#) - 4 dic. 2015

... Cibersam, dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de ... Según el profesor Cervilla Ballesteros, "las **psicosis** son los trastornos ...



### [Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granad...](#)

[Teleprensa World](#) - 4 dic. 2015

Las personas que experimentan **psicosis** pueden presentar alucinaciones o ... dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de Salud ...



### [Determinan científicamente los síntomas de los tres tipos ...](#)

[Acta Sanitaria](#) - 4 dic. 2015

... dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de ... ha permitido mejorar el diagnóstico de los tres tipos más frecuentes de **psicosis** ...

[ibercampus.es](#)



### [Investigadores españoles 'revolucionan' el diagnóstico de ...](#)

[ABC.es](#) - 4 dic. 2015

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San ...

### [Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granad...](#)

[infocostatropical.com](#) - 4 dic. 2015

... dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de ... La **psicosis** hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o ...

### [Revolución en el diagnóstico de la psicosis](#)

[IntraMed](#) - 4 dic. 2015

Revolución en el diagnóstico de la **psicosis** ... catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, ...

[ibercampus.es](#)

### [Determinan por primera vez los síntomas de los tres tipos ...](#)

[Europa Press](#) - 4 dic. 2015

... el catedrático de la **Universidad de Granada** (UGR) y de la Unidad de Salud ... La **psicosis** hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o ...

### [Científicos de la UGR determinan por primera vez los sínt...](#)

[20minutos.es](#) - 4 dic. 2015

... el catedrático de la **Universidad de Granada** (UGR) y de la Unidad de Salud ... La **psicosis** hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o ...

[ibercampus.es](#)

### [Científicos de la UGR determinan por primera vez los sínt...](#)

[Te Interesa](#) - 4 dic. 2015

... el catedrático de la **Universidad de Granada** (UGR) y de la Unidad de Salud ... La **psicosis** hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o ...

[ibercampus.es](#)

Científicos de la UGR determinan por primera vez los sínt...

Andalucía Información - 4 dic. 2015

... el catedrático de la **Universidad de Granada** (UGR) y de la Unidad de Salud ... La **psicosis** hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o ...

ibercampus.es

Estar informado de los resultados de **"Universidad de Granada" psicosis**.

Crear alerta

Anterior

1 2 3 4

Siguiente

La selección y la colocación de artículos en esta página se ha determinado automáticamente mediante un programa informático. La fecha y la hora que aparecen muestran cuándo se ha actualizado o se ha añadido un artículo a Google Noticias.

Ayuda

Danos tu opinión

Privacidad

Condiciones



[Todo](#)
[Imágenes](#)
[Noticias](#)
[Vídeos](#)
[Maps](#)
[Más ▾](#)


[Todas las noticias ▾](#)
[Última semana ▾](#)
[Ordenados por fecha ▾](#)
[Mostrar duplicados ▾](#)
[Borrar](#)


### Revolución en el diagnóstico de la **psicosis**

CIENCIAEXPLORA - ATRESMEDIA (Comunicado de prensa) - 4 dic. 2015

Revolución en el diagnóstico de la **psicosis** ... catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, ...



ibercampus.es

### Determinan por primera vez los síntomas de los tipos más ...

Europa Press - 4 dic. 2015

... el catedrático de la **Universidad de Granada** (UGR) y de la Unidad de Salud ... La **psicosis** hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o ...



ibercampus.es

### Científicos de la UGR determinan por primera vez los sínt...

Gente Digital - 4 dic. 2015

... por primera vez los síntomas de los tres tipos más frecuentes de **psicosis** ... por el catedrático de la **Universidad de Granada** (UGR) y de la Unidad de Salud ...



ibercampus.es

### Científicos de la UGR determinan por primera vez los sínt...

Lainformacion.com - 4 dic. 2015

... el catedrático de la **Universidad de Granada** (UGR) y de la Unidad de Salud ... La **psicosis** hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o ...

### Revolución en el diagnóstico de la **psicosis**

SINC - 4 dic. 2015

Revolución en el diagnóstico de la **psicosis** ... catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San Cecilio de Granada, ...

### Científicos andaluces revolucionan el diagnóstico de la ps...

RTVE - 4 dic. 2015

Un estudio del grupo de investigación CIBERSAM, dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de Salud Mental del Hospital San ...

### Determinan por primera vez los síntomas de los tres tipos ...

Deia - 4 dic. 2015

... dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de ... La **psicosis** hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o ...

ibercampus.es

### Determinan por primera vez síntomas de los tres principal...

eldia.es - 4 dic. 2015

... Cibersam, dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de ... Según el profesor Cervilla Ballesteros, "las **psicosis** son los trastornos ...

ibercampus.es

### Un estudio determina por primera vez los síntomas de los ...

Noticias de Navarra - 4 dic. 2015

... dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de ... La **psicosis** hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o ...

ibercampus.es

[Determinan por primera vez los síntomas de los tres princi...](#)

El Periódico - 4 dic. 2015

... Cibersam, dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de ... Según el profesor Cervilla Ballesteros, "las **psicosis** son los trastornos ...

ibercampus.es

Estar informado de los resultados de **"Universidad de Granada" psicosis**.

Crear alerta

[Anterior](#)

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#)

[Siguiete](#)

La selección y la colocación de artículos en esta página se ha determinado automáticamente mediante un programa informático. La fecha y la hora que aparecen muestran cuándo se ha actualizado o se ha añadido un artículo a Google Noticias.

[Ayuda](#)

[Danos tu opinión](#)

[Privacidad](#)

[Condiciones](#)



[Todo](#)
[Imágenes](#)
[Noticias](#)
[Vídeos](#)
[Maps](#)
[Más ▾](#)


[Todas las noticias ▾](#)
[Última semana ▾](#)
[Ordenados por fecha ▾](#)
[Mostrar duplicados ▾](#)
[Borrar](#)


ibercampus.es

### Determinan por primera vez síntomas de los tres principal...

[Radio Intereconomía \(Comunicado de prensa\)](#) - 4 dic. 2015

... Cibersam, dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de ... Según el profesor Cervilla Ballesteros, "las **psicosis** son los trastornos ...



ibercampus.es

### Determinan por primera vez síntomas de los tres principal...

[eldia.es](#) - 4 dic. 2015

... vez científicamente los síntomas de los tres tipos más frecuentes de **psicosis** que ... dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de ...

### Determinan por primera vez síntomas de los tres principales tipos ...

[La Vanguardia](#) - 4 dic. 2015

... dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de ... La **psicosis** hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o ...



ibercampus.es

### Determinan por primera vez los síntomas de los tres tipos ...

[Ideal Digital](#) - 4 dic. 2015

... Cibersam, dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de ... Según el profesor Cervilla Ballesteros, "las **psicosis** son los trastornos ...

### Científicos de la UGR y el Hospital San Cecilio de Granad...

[GranadaDigital](#) - 4 dic. 2015

... dirigido por el catedrático de la **Universidad de Granada** y de la Unidad de ... La **psicosis** hace referencia a un estado mental descrito como una escisión o ...

Estar informado de los resultados de **"Universidad de Granada" psicosis**.

[Anterior](#)    [1](#)   [2](#)   [3](#)   [4](#)

La selección y la colocación de artículos en esta página se ha determinado automáticamente mediante un programa informático. La fecha y la hora que aparecen muestran cuándo se ha actualizado o se ha añadido un artículo a Google Noticias.

[Ayuda](#)
[Danos tu opinión](#)
[Privacidad](#)
[Condiciones](#)